



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS DE IMPERATRIZ
CURSO DE MEDICINA

LUÍS THADEU REBOUÇAS SANTOS

**ANÁLISE ENTRE SINTOMAS DO TRATO GASTROINTESTINAL ALTO E ACHADOS
ENDOSCÓPICOS DE PACIENTES SUBMETIDOS A ENDOSCOPIA DIGESTIVA
ALTA EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA NO INTERIOR DO MARANHÃO**

LUÍS THADEU REBOUÇAS SANTOS

**ANÁLISE ENTRE SINTOMAS DO TRATO GASTROINTESTINAL ALTO E ACHADOS
ENDOSCÓPICOS DE PACIENTES SUBMETIDOS A ENDOSCOPIA DIGESTIVA
ALTA EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA NO INTERIOR DO MARANHÃO**

Trabalho de Conclusão de Ciclo apresentado
ao Curso de Medicina da Universidade
Federal do Maranhão - UFMA/Imperatriz,
como parte dos requisitos para a obtenção do
título de Bacharel em Medicina.

Orientador(a): Prof. Marcos Antonio
Custódio Neto da Silva.

Imperatriz, Maranhão

2023

Rebouças Santos, Luis Thadeu.

ANÁLISE ENTRE SINTOMAS DO TRATO GASTROINTESTINAL ALTO E
ACHADOS ENDOSCÓPICOS DE PACIENTES SUBMETIDOS A ENDOSCOPIA
DIGESTIVA ALTA EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA NO INTERIOR DO
MARANHÃO / Luis Thadeu Rebouças Santos. - 2023.

57 p.

Orientador(a): Marcos Antonio Custódio Neto da Silva.
Curso de Medicina, Universidade Federal do Maranhão,
Imperatriz- MA, 2023.

1. Adesão às diretrizes. 2. Dispepsia. 3.
Endoscopia. 4. H.Pylori. I. Custódio Neto da Silva,
Marcos Antonio. II. Título.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS DE IMPERATRIZ
CURSO DE MEDICINA

Candidato: Luís Thadeu Rebouças

Título: ANÁLISE ENTRE SINTOMAS DO TRATO GASTROINTESTINAL ALTO E ACHADOS ENDOSCÓPICOS DE PACIENTES SUBMETIDOS A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA NO INTERIOR DO MARANHÃO

Orientador: Prof. Marcos Antonio Custódio Neto da Silva.
Universidade Federal do Maranhão- Curso de Medicina/CCIm

A Banca Julgadora de trabalho de Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, em sessão pública realizada a 27/09/2023, considerou

Aprovado ()

Reprovado ()

Banca examinadora:

Presidente: Prof. Marcos Antonio Custódio Neto da Silva
Universidade Federal do Maranhão – Curso de Medicina/CCIm

Prof. Melissa Marra Cesário
Universidade Federal do Maranhão – Curso de Medicina/CCIm

Prof. Raquel Loiola Gomes
Universidade Federal do Maranhão – Curso de Medicina/CCIm

Imperatriz-MA, 27 de setembro de 2023

SUMÁRIO

1. RESUMO.....	6
2. ABSTRACT	7
3. RESUMEN	8
CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO.....	Erro! Indicador não definido.
4. INTRODUÇÃO.....	Erro! Indicador não definido.
5. MÉTODOS.....	Erro! Indicador não definido.
6. RESULTADOS	Erro! Indicador não definido.
7. DISCUSSÃO	Erro! Indicador não definido.
REFERÊNCIAS	Erro! Indicador não definido.
TABELAS E FIGURAS.....	Erro! Indicador não definido.
ANEXOS	Erro! Indicador não definido.
APÊNDICE	Erro! Indicador não definido.

Título: ANÁLISE ENTRE SINTOMAS DO TRATO GASTROINTESTINAL ALTO E ACHADOS ENDOSCÓPICOS DE PACIENTES SUBMETIDOS A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA NO INTERIOR DO MARANHÃO

Autores: Luís Thadeu Rebouças Santos, Marcos Antonio Custódio Neto da Silva

Status: Não submetido

Revista: Epidemiologia e Serviços de Saúde: revista do Sistema Único de Saúde do Brasil (RESS)

ISSN: 2237-9622

Fator de Impacto: Qualis A3

DOI:

1. RESUMO

Objetivo: analisar aspectos clínicos e endoscópicos de pacientes dispépticos submetidos à endoscopia digestiva alta em centro de referência no interior do Maranhão. **Métodos:** pesquisa observacional, descritiva e analítica através de entrevista e laudos endoscópicos de 80 pacientes com queixas dispépticas submetidos à EDA. **Resultados:** 66,25% dos entrevistados eram mulheres, a maioria tinha idade ≥ 40 anos e epigastria como sintoma principal. 29,75% não tinha indicação apropriada para realizar EDA. Gastrite enantematosa leve de antro foi o achado mais frequente. 92,5% tiveram achados não significativos. Teste rápido de urease foi positivo em 25%. Os seguintes achados apresentaram correlação estatística significativa ($p < 0,05$): idade < 40 anos, sexo feminino e lesão gástrica com teste da urease positivo; tabagismo com lesão gástrica e idade menor que 40 anos com exame normal. Os pacientes com achados significativos apresentavam indicações apropriadas para EDA. **Conclusão:** A indicação correta da EDA é imprescindível para rendimentos endoscópicos satisfatórios e diagnósticos precisos.

Palavras-chave: Dispepsia; Endoscopia; Adesão às diretrizes; *H.Pylori*.

2. ABSTRACT

Objective: to analyze clinical and endoscopic aspects of dyspeptic patients submitted to EDA in a reference center in the interior of Maranhão. **Methods:** observational, descriptive and analytical research through interviews and endoscopic reports of 80 patients with dyspeptic complaints submitted to EDA. **Results:** 66.25% of respondents were women, most were aged ≥ 40 years and had epigastric pain as their main symptom. 29.75% had no appropriate indication to perform EDA. Mild enanthematous gastritis of the antrum was the most frequent finding. 92.5% had non-significant findings. Rapid urease test was positive in 25%. The following findings showed a statistically significant correlation ($p < 0.05$): age < 40 years, female gender and gastric lesion with positive urease test; smoking with gastric lesion and age less than 40 years with normal examination. Patients with significant findings had appropriate indications for UDE. **Conclusion:** The correct indication of EDA is essential for satisfactory endoscopic yields and accurate diagnoses.

Keywords: Dyspepsia; Endoscopy; Adherence to guidelines; H. Pylori.

3. RESUMEN

Objetivo: analizar aspectos clínicos y endoscópicos de pacientes dispépticos sometidos a EDA en un centro de referencia del interior de Maranhão. **Métodos:** investigación observacional, descriptiva y analítica a través de entrevistas e informes endoscópicos de 80 pacientes con quejas dispépticas remitidos a la EDA. **Resultados:** el 66,25% de los encuestados eran mujeres, la mayoría tenía edad ≥ 40 años y presentaba dolor epigástrico como síntoma principal. El 29,75% no tenía indicación adecuada para realizar AED. La gastritis enantemática leve del antro fue el hallazgo más frecuente. El 92,5% tuvo hallazgos no significativos. La prueba rápida de ureasa fue positiva en el 25%. Los siguientes hallazgos mostraron una correlación estadísticamente significativa ($p < 0,05$): edad < 40 años, género femenino y lesión gástrica con prueba de ureasa positiva; Tabaquismo con lesión gástrica y edad menor de 40 años con examen normal. Los pacientes con hallazgos significativos tenían indicaciones apropiadas para UDE. **Conclusión:** La correcta indicación de la AED es fundamental para obtener rendimientos endoscópicos satisfactorios y diagnósticos certeros.

Palabras llave: Dispepsia; endoscopia; Cumplimiento de las pautas; H. Pylor

